


Dr. med. Horst Eisold
Internist und Gastroenterologe
Gastroenterologische Schwerpunktpraxis

72116 Mössingen
Bahnhofstr. 9
Telefon: 0 74 73 / 94 82 10
Telefax: 0 74 73 / 94 82 20
e-mail: HorstEisold@TeleMED.de
www.aerzte-im-netz.de/Horst.Eisold

Hinweise für Patienten zum Verhalten nach Polypektomie

Betrifft:



Bei Ihnen wurde am _____ aus dem Dickdarm ein Polyp mit der elektrischen Schlinge entfernt. Sie sollen sich eine Woche lang nach dem Eingriff körperlich schonen, damit nicht durch schwere körperliche Tätigkeit die Wunde aufreißt und blutet. Trotzdem kann es in seltenen Fällen nach Polypektomien zu Komplikationen kommen, und zwar

1. Blutungen und
2. Perforationen,

das heißt, Bildung eines Loches, in der Darmwand an der Stelle der Abtragung.

Die Blutung macht sich durch Blutaustritt aus dem After bemerkbar, die Perforation durch heftige Bauchschmerzen. Sollte eines dieser Symptome auftreten, ist sofortige Krankenhausbehandlung erforderlich. Setzen Sie sich im gegebenen Falle unverzüglich mit mir telefonisch oder direkt in Verbindung unter

Telefon: 0 74 73 / 94 82 10

Sollten Sie mich aus irgendeinem Grunde nicht erreichen, informieren Sie bitte sofort Ihren Hausarzt oder begeben Sie sich in Ihr zuständiges Kreiskrankenhaus. Fahren Sie nicht selbst, sondern lassen Sie sich am besten mit dem Krankenwagen fahren. Nehmen Sie bitte diesen Zettel zur Information für die dortigen Ärzte mit. Auf der beiliegenden Skizze ist die Lage des abgetragenen Polypen und seine Größe angegeben.

Vor der Polypektomie wurden bei Ihnen Blutwerte bestimmt, wobei sich folgende Werte ergaben:

Quickwert: _____

Thrombozyten: _____

PTT: _____

Hb: _____